

Traduction du dossier diabète

Diabète

Définition

Il y a disfonctionnement du métabolisme en hydrates de carbone, celui-ci étant dû à un manque relatif ou absolu d'insuline.

Troubles

Le manque d'insuline fait monter le niveau de sucre dans le sang et provoque des dérangements importants du métabolisme cellulaire. Le niveau de sucre trop élevé dans l'organisme provoque des dégâts au niveau des parois artérielles, réduit la capacité du sang à transporter de l'oxygène et réduit la circulation sanguine. Les risques de thrombose et d'obstruction artérielle augmentent. Plus le diabète est ancien et le niveau de sucre dans le sang important, plus les risques de dommages à long terme sont à craindre. Ceux-ci vont avoir des effets surtout au niveau du système artériel.

Causes

Diabète mellitus Type 1 : Probablement une maladie du système immunitaire dans laquelle les cellules productrices d'insuline cessent leur activité.

Diabète mellitus Type 2 : Souvent causé par l'alimentation

Le pancréas génère trop peu d'insuline ou celle-ci n'est pas assez efficace suite à des dérangements du métabolisme. Dans le pire des cas, il n'y a plus d'insuline produite ce qui a pour conséquence que le sucre ainsi que les aliments qui en sont riches ne sont pas digérés correctement. Cela entraîne une augmentation du niveau de sucre dans le sang.

Rapport d'utilisateurs

A/Grâce à l'utilisation de la thérapie Bemer 3000 une amputation d'un pied a pu être évitée.

1. Un patient atteint de diabète depuis plusieurs années fut soigné avec de l'insuline. Après un accident au niveau du pied (chute d'une poutre sur le pied) une infection s'est développée : une ischémie (terme angl.) se développant et une gangrénisation du pied avant. Après consultation d'un chirurgien artériel une amputation sous le genou fut envisagée.
2. Au paravant une thérapie classique avec des antibiotiques, des médicaments favorisant la circulation sanguine et des soins sous pression hyperbare fut appliquée. L'utilisation de l'applicateur intensif du système Bemer (programme 4) vint en complément. L'utilisation se fit trois à quatre fois de façon quotidienne sur une durée de deux semaines. Grâce à l'amélioration sensible sur cette période, l'amputation n'eut pas lieu et on a du seulement retirer un orteil.
3. En accompagnement à la guérison de la plaie, l'utilisation du système Bemer fut maintenue pendant encore deux semaines dans le domicile du patient. La guérison de la plaie se fit sans complications, à l'encontre des attentes des chirurgiens.

B/Docteur en médecine R.O. :

Des rapports de cas intéressants à propos de la thérapie à bas de champs magnétiques :
Patient G.B. né le 1/06/1930 :

Diabète mellitus type 2 depuis 30 ans, cholelithiose, hypertonie artérielle.
Depuis 21.5 années de fortes paresthésies et des douleurs permanentes dans les deux
jambes ainsi que dans les mains, l'ouverture du poing était également très
douloureuse.

Cliniquement tout a été vérifié, une thérapie, entre autre à base de Thioctacid 600 en
raison d'une présomption d'une poly neuropathie diabétique, fut mise en place.

Toutefois les impulsions périphériques du pied n'étaient plus palpables de manière
certaine.

La thérapie à base de champs magnétiques fut appliquée le matin avec le niveau 4 et le
soir avec le niveau 1 en raison de troubles du sommeil.

Après la 3^e utilisation, les douleurs dans les jambes et dans les mains avaient
disparu !!!

C/De H.S.

Le patient masculin, âgé de 65 ans, souffre depuis 24 ans du diabète. Toutefois il ne
souffre que depuis 8 ans de problèmes de santé d'abord légers puis plus importants.
Des douleurs rhéinales, des troubles de la vision ainsi que des problèmes de circulation
sanguine au niveau des pieds et des mains se mirent en place. Il y a 2 ans le 4^e orteil du
pied droit a du être amputé. La plaie qui en a résulté guérissait très mal. La jambe était
enflée et douloureuse du pied jusqu'au genou. Un remède possible seraient les
infusions à Bad Berka pour un « nettoyage des artères ». Le traitement a duré 4
semaines et a coûté à peu près 10.000,00 DM à l'assurance maladie. Le traitement est
à répéter dans un délai de trois mois.

A cause de l'amputation de l'orteil, une grande difficulté à marcher était présente. Le
pied ne pouvait plus se dérouler correctement. Seule une marche sur le talon (boiter)
était possible.

Grâce à des études scientifiques on savait que l'on pouvait obtenir de bons résultats
chez les diabétiques grâce à des champs électromagnétiques pulsés. Ces appareils sont
connus sous le nom de Bemer 3000. La psychothérapeute a conseillé l'utilisation du
système Bemer 3000.

Le patient espérait une diminution de ses peines grâce à l'application de la thérapie
qu'il a suivie au sein d'une psychothérapie de trois mois (août à octobre 2000)
dans les conditions d'utilisations recommandées

Résultats :

- Nette amélioration de son état général
- Amélioration de ses valeurs reinales
- Amélioration de l'activité artérielle dans les jambes (constaté à Bad Berka
grâce à un sono gramme Doppler)
- Le déroulement de son pied était à nouveau possible
- Activité corporelle augmentée
(Promenades avec le chien, travaux jardiniers, faire les courses)

L'assurance maladie ne prit en charge aucune participation à l'achat d'un appareil
Bemer, le patient a dû, par conséquent mettre un terme à la thérapie en octobre 2000.
A partir de mi-février 2001 son état se dégrade nettement.